



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: Health@kmda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

26.03.2020 № 061-3210/04.03
на вх. № 061/4174 від 11.03.2020

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України
вул. М. Грушевського, 7,
м. Київ, 01601
fincenrmoz@gmail.com
medicinedemand@gmail.com

Про заявку в частині 100 % потреби на 2020 рік у медичних виробих для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

На лист Міністерства охорони здоров'я України від 10.03.2020 № 10.3-10/6824/2-20 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає заявку в частині 100 % потреби на 2020 рік на закупівлю медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз, за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 у частині «Закупівля медикаментів та медичних виробів для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз».

Додатково повідомляємо, що 20.03.2020 зазначена інформація розміщена у системі Med Data за посиланням: <http://meddata.com.ua>.

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Тищенко І.Г.
Соловкіна О.М., 2840811

Медичні виробни для громадян, які страждають на бульозний епідермоїз

№	Міжнародна іспатентована назва лікарського засобу / Назва лікарського виробу	Форма випуску	Одиниця виміру	Орієнтовна ціна за одиницю	Всього		Залишки станом на 01.01.13		Очікувані поставки	Річний обсяг 100% потреби
					кількість одиниць	ціна	кількість одиниць	ціна		
1	Бинт еластичний фіксуючий БАТІСТ® FIXA-SRER 12 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	5	0	0	0	0	0	3 012
2	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерілоф® Lite 20x30 см, або еквівалент	1 пов'язка	1 пов'язка	1 207	0	0	0	0	0	6 828
3	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерілоф® Transfer 20x30 см, або еквівалент	1 пов'язка	1 пов'язка	1 328	0	0	0	0	0	4 614
4	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерілоф® 10x13 см, або еквівалент	1 сітка	1 сітка	215	0	0	0	0	0	7 104
5	Пов'язки спеціальні Tubifast TM RED LINE 10 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	263	0	0	0	0	0	24
6	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	351	0	0	0	0	0	288
7	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	366	0	0	0	0	0	144
8	Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line 10 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	526	0	0	0	0	0	60
9	Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	731	0	0	0	0	0	96
10	Серветки з негілкового матеріалу Mesofix, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент	1 серветка	1 серветка	1	0	0	0	0	0	50 940
11	Бинт еластичний фіксуючий БАТІСТ® FIXA-SRER 4 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	2	0	0	0	0	0	816
12	Бинт еластичний фіксуючий БАТІСТ® FIXA-SRER 6 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	3	0	0	0	0	0	2 352
13	Бинт еластичний фіксуючий БАТІСТ® FIXA-SRER 8 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	4	0	0	0	0	0	4 200
14	Бинт еластичний фіксуючий БАТІСТ® FIXA-SRER 10 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт	1 бинт	5	0	0	0	0	0	4 152
					11	12	13	14	15	16
					0	0	0	0	0	0

Директор Департаменту охорони здоров'я

Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник управління лікувально-профілактичної допомоги

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

Ірина ТИЩЕНКО

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дерматовенерології

Ольга ЧУБАР

ДАНИ ПРО ТРОМАДИАН, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ВУЛЬЗОЗНІ ЕПІДЕРМОЛІЗ, М. КИЇВ

№	ІПБ	Дата народження	Місяць, рік, ст.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання (Вірнінгенський індекс, бала)	Розміщення уражень (локалізація уражень) (частини тіла)	Площа уражень, %	Ускладнення	Лікарські засоби та методи медичного призначення	Кількість оцінок препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікс® Transfer 20x30 см, або еквівалент, 1 пов'язка.	48	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Прозакни спеціальні Tubifast™ GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	38	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Прозакни спеціальні Tubifast™ BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Прозакни спеціальні Tubifast™ YELLOW Line 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Прозакни спеціальні Tubifast™ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Сорбенти з встановленим мікродозом Мезол, стерильні, ЮніПок (2 шт), або еквівалент, 1 серветка.	3600	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER, 6 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	240	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER, 8 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	240	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER, 10 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	240	ТАК
1	ФАА	29.09.2012	22	120	проста форма, підтип Дарлінг-Меара (квітлично). Ерозії СОПР. Хронічні закрепи. Лактозна непереносимість. Білково-енергетична недостатність 2-3 ступеня.	32,8	генералізована	/ інше /23,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER 12 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	240	ТАК
2	ЦІБ	24.03.1996	46	168	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Хронічний катаральний гінгівіт, кератомія. Кістки обох щелеп, стан після кісткової фронтальної та бічної кісток, респекцій верхівок - 22,21,41,42,43, виділення 46,48. Поліферійність анемія І ступеня. Рубцева алопеція. Білков	46	генералізована	/ інше /30,00	анемія, алопеція, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічний больовий синдром, хронічні закрепи, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікс® Transfer 20x30 см, або еквівалент, 1 пов'язка.	120	ТАК
2	ЦІБ	24.03.1996	46	168	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Хронічний катаральний гінгівіт, кератомія. Кістки обох щелеп, стан після кісткової фронтальної та бічної кісток, респекцій верхівок 22,21,41,42,43, виділення 46,48. Поліферійність анемія І ступеня. Рубцева алопеція. Білков	46	генералізована	/ інше /30,00	анемія, алопеція, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічний больовий синдром, хронічні закрепи, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікс® Transfer 20x30 см, або еквівалент, 1 пов'язка.	120	ТАК
2	ЦІБ	24.03.1996	46	168	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Хронічний катаральний гінгівіт, кератомія. Кістки обох щелеп, стан після кісткової фронтальної та бічної кісток, респекцій верхівок 22,21,41,42,43, виділення 46,48. Поліферійність анемія І ступеня. Рубцева алопеція. Білков	46	генералізована	/ інше /30,00	анемія, алопеція, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічний больовий синдром, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER, 6 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	36	ТАК
2	ЦІБ	24.03.1996	46	168	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Хронічний катаральний гінгівіт, кератомія. Кістки обох щелеп, стан після кісткової фронтальної та бічної кісток, респекцій верхівок 22,21,41,42,43, виділення 46,48. Поліферійність анемія І ступеня. Рубцева алопеція. Білков	46	генералізована	/ інше /30,00	анемія, алопеція, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, хронічний больовий синдром, хронічні закрепи, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIST® FIXA-CRER, 8 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК

№	ПІБ	Дата народження	Місяць, день, рік	Зріст, см	Форми захворювання	Тяжкість захворювання за шкалою Бірмінгемського індексу, балів	Розміщення уражень (локалізація на/генералізація/овала)	Доказавши уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Усвідомлення	Лікарські засоби та виробничого призначення	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Засіб для підкритих рах, стерильний МеріксФ Тапобег 20x30 см, або еквівалент, 1 пов'язка, або еквівалент, 1 пов'язка,	960	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Засіб для підкритих рах, стерильний МеріксФ Тапобег 20x30 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	860	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	24	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	24	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Сорняки з негашеного матеріалу Mesofix, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 сорняк.	7200	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIFIX FIX-A-CREP 4 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	120	ТАК
3	КВІ	11.03.2006	24	150	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Множинні ерозії СОПР, мікротомія, анкілоз, можливий хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Псевдосиндактилія по типу «кулачок» та деформація	50	генералізована	/інше	/26,00	анонікс, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс / апалія емалі, псевдосиндактилія та контрактури, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIFIX FIX-A-CREP 6 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	1080	ТАК

№	ПІБ	Дата народження	Місяць, день, рік	Вік	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання	Розміщення ураження (локалізація уражень/генералізація уражень)	Локалізація уражень (частини тіла)	Цілова ураженість, %	Ускладнення	Лікарські засоби та виробниче медичного призначення	Кількість одиниць препарату застосованого на рік	Включити в розрахунок 100% потреби
3	КВІ	11.03.2006	24	150	редисна дистрофічна форма, генералізований лідній. Множинні ерозії СОПР, мікротравми, діхтілоз, множинні хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Поліефітний анкіл середнього ступеня важкості. Псевдоінфекція по типу «вулкана» та деформіа	50	генералізована	/інше	/26,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс/опалія еналі, псевдоінфекція та контрактур, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Бінт еластичний фіксуючий BATHIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт,	720	ТАК	
3	КВІ	11.03.2006	24	150	редисна дистрофічна форма, генералізований лідній. Множинні ерозії СОПР, мікротравми, діхтілоз, множинні хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Поліефітний анкіл середнього ступеня важкості. Псевдоінфекція по типу «вулкана» та деформіа	50	генералізована	/інше	/26,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс/опалія еналі, псевдоінфекція та контрактур, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Бінт еластичний фіксуючий BATHIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт,	240	ТАК	
3	КВІ	11.03.2006	24	150	редисна дистрофічна форма, генералізований лідній. Множинні ерозії СОПР, мікротравми, діхтілоз, множинні хронічний каріс. Рубцевий стеноз стравоходу. Поліефітний анкіл середнього ступеня важкості. Псевдоінфекція по типу «вулкана» та деформіа	50	генералізована	/інше	/26,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, каріс/опалія еналі, псевдоінфекція та контрактур, стеноз стравоходу, хронічні закрени, інше	Бінт еластичний фіксуючий BATHIST® FIXA-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт,	120	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Lite 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	120	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Transfer 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	240	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® 10x18 см, або еквівалент, 1 бинт,	60	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Пов'язки спеціальні Tubifast™ GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт,	60	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Пов'язки спеціальні Tubifast™ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт,	12	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Серветки з нежного матеріалу Mesoft, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 серветка,	1800	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Бінт еластичний фіксуючий BATHIST® FIXA-CREP, 8 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт,	600	ТАК	
4	КАО	12.11.2012	21	122	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Онкохлострофія. Часткова онкохлострофія нігтів великих пальців долоней та анкілія стоп. Хронічні закрени. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	14,25	локалізована	/інше	/7,00	анкілія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, псевдоінфекція та контрактур, хронічні закрени	Бінт еластичний фіксуючий BATHIST® FIXA-CREP, 10 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт,	240	ТАК	
5	ЧМІ	18.01.2012	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Lite 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	84	ТАК	
5	ЧМІ	18.01.2012	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність 1 ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Transfer 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	60	ТАК	

№	ІПБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Брінліґем (Індексом, балл)	Розміщення уражень (локалізована / генералізована)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Ускладнення	Лікарські засоби та вибір медичного призначення	Класифікаційна оцінка препарату на рік застосування	Відсоток розрахунок 100% потреби
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікеф 10x18 см, або еквівалент, І білг.	180	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент, І білг.	24	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line 10 м, або еквівалент, І білг.	12	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, І білг.	12	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Серветки з негнаною мікрофіброю Mesoif, стерильні, 1шт(10м (2 шт), або еквівалент, І серветка.	3600	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Винт еластичний фіксуючий BASTIS® FIXA-CREP, 8 см x 4 м або еквівалент, І білг.	240	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Винт еластичний фіксуючий BASTIS® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент, І білг.	240	ТАК
5	ЧМІ	18.01.2002	25	135	дистрофічна форма. Ерозії СОПР. Білково-енергетична недостатність І ступеня	18,75	локалізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, інше	Винт еластичний фіксуючий BASTIS® FIXA-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент, І білг.	240	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікеф 10x18 см, або еквівалент, І пов'язка.	144	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікеф 10x18 см, або еквівалент, І пов'язка.	288	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Засіб для відкритих ран, стерильний Мерікеф 10x18 см, або еквівалент, І білг.	144	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM RED LINE 10 м, або еквівалент, І білг.	12	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент, І білг.	12	ТАК
6	М ІО	26.02.1990	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформация пальців долоней і стоп. Ерозії СОПР. Множинний марікс. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13,00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, марікс / аплазія емалі, псевдоіндивідуальна та контрактурна, стеноз стравоходу, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line 10 м, або еквівалент, І білг.	12	ТАК

№	ПІВ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання на тлі ВІВІ-інфекції (за шкалою Ієдессона-Баллі)	Розміщення уражень (локалізована / генералізована / на генералізовані овальні)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Ускладнення	Лікарські засоби та вибори медичного призначення	Кількість одиниць препарату на рік лікування	Висновок про ризикунок 100% потреби
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Препарати спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE 10 м, або ексвалент, 1 бинт,	12	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Серветки з нетканого матеріалу Messif, стерильні, 10х10см (2 шт), або ексвалент, 1 серветка,	7200	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP 4 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	576	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	576	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	432	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	576	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	432	TAK
6	МІО	26.02.2000	46	172	рецидивна дистрофічна форма. Рубцевий стеноз стравоходу. Часткова псевдоіндивідуальна та деформіція пальців долонь і стоп. Ерозії СОПР. Множинний ерозив. Вроджена тугоухість. Білково-енергетична недостатність II ступеня	39,5	генералізована	/інше	/13.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або ексвалент, 1 бинт,	12	TAK
7	МВС	01.01.2002	33	142	простя локалізована форма	8,25	локалізована	/інше	/8.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Засіб для відкриття рани, стерильний Messif Transfer 20x50 см, або ексвалент, 1 пов'язка,	48	TAK
7	МВС	01.01.2002	33	142	простя локалізована форма	8,25	локалізована	/інше	/8.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або ексвалент, 1 бинт,	12	TAK
7	МВС	01.01.2002	33	142	простя локалізована форма	8,25	локалізована	/інше	/8.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Серветки з нетканого матеріалу Messif, стерильні, 10х10см (2 шт), або ексвалент, 1 серветка,	540	TAK
7	МВС	01.01.2002	33	142	простя локалізована форма	8,25	локалізована	/інше	/8.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	36	TAK
7	МВС	01.01.2002	33	142	простя локалізована форма	8,25	локалізована	/інше	/8.00	білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, ерозії / аплазія есмлі, псевдоіндивідуальна та контрактурні, стеноз стравоходу, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або ексвалент, 1 бинт,	36	TAK

№	ПІБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання	Розміщення ураження (локалізація/генералізація/частини тіла)	Локалізація уражень (частини тіла)	Процент уражень, %	Усвідомлення	Лікарські засоби та виробні медичного призначення	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерлікс® Lite 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка.	1200	ТАК
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерлікс® Transfor 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка.	960	ТАК
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерлікс® 10x18 см, або еквівалент, 1 сітка.	240	ТАК
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	48	ТАК
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	72	III
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Серветки з нетканого матеріалу Messo®, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 серветка.	5400	ТАК
8	БМС	28.04.1998	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Псевдоіндиасталія та деформція долоней та стоп. Рубцевий стеноз стравоходу. Полідактилія анемія важкого ступеня. Мікростомія. Анкілозозія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Денупіліація язика.	60	генералізована	/інше	/30,00	анемія, авіонікія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, карієс / аплазія емалі, остеопенія / остеопороз, псевдоіндиасталія та контрактурні стеноз стравоходу, ураження слизової сечостатевої системи, хронічний больовий синдром, інше	Бинт шпательний фізуроний BASTIF® EKA-CRBP, 10 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт.	180	ТАК

№	ПІВ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання на даний час (Бірінгемський індекс, балів)	Розміщення уражень (локалізація/генералізація/генералізація)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Усугублення	Лікарські засоби та виробничі медичного призначення	Кількість дощипів препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
8	БМС	28.04.1978	38	176	рецидивна дистрофічна форма, генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Псевдоінфекційний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна мікростомія. Ангілоплазія. Ангулярний хейліт. Множинні ерозії СОРП. Деміліація язика	60	генералізована	/інше	/30.00	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, карієс / апікалі ерозії, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна стеноз стравоходу, ураження слизової стінки стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Бинт спеціальний фіксуючий VATSY® FIX-A-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	180	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Line 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	4200	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Line 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	960	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Засіб для відкриття ран, стерильний Мерікс® Line 20x50 см, або еквівалент, 1 пов'язка,	3400	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Бинт спеціальний фіксуючий VATSY® FIX-A-CREP, 10 см x 4 м або еквівалент, 1 бинт,	1200	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast™ GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт,	12	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast™ BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт,	48	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтип. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофіброзальний рефлюкс. Часткова псевдоінфекційна пальців обох рук. Полідефіцитна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48.50	анемія, анемія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоінфекційна та контрактурна, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний більший синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast™ YELLOW Line 10 м, або еквівалент, 1 бинт,	12	ТАК

№	ПІВ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форми захворювання	Тяжкість захворювання за Брінлігсом (індексом, балів)	Розміщення уражень (локалізація під'єднань під'єднань)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Усвідомлення	Лікарські засоби та виробні медичного призначення	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Тов'язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Серакти з петляного матеріалу Мезой, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 серахта.	14400	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Бинт еластичний фіксуючий ВАТІST® FIXA-CREP 4 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	120	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Бинт еластичний фіксуючий ВАТІST® FIXA-CREP 6 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	120	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Бинт еластичний фіксуючий ВАТІST® FIXA-CREP 8 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	120	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Бинт еластичний фіксуючий ВАТІST® FIXA-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	1200	ТАК
9	ЗАО	02.12.2002	25	147	рецидивна дистрофічна форма, важкий генералізований підтіл. Рубцевий стеноз стравоходу, стан після дилатації. Гастрофобальний рефлюкс. Часткова псевдоіндивідуальна пальців обох рук. Поліфецітна анемія середнього ступеня важкості. Множинні ерозії СОРП.	80,5	генералізована	/інше	/48,50	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, псевдоіндивідуальна та контрактур, рефлюкс-езофагіт, стеноз стравоходу, хронічний больовий синдром, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	12	ТАК
10	СОО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОРП, депаніювання хзид, хейліт. Викривлення перегородки носа. Поліфецітна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність (ступеня. Хронічні закрепи.	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, апносія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОРП, остеопенія / остеопороз, хронічні закрепи, інше	Засіб для підкріплення стержневий МетріФоб Тгабер 20x30 см, або еквівалент, 1 поя'язка.	1080	ТАК

№	ЛПБ	Дата народження	Маса тіла, кг.	Зріст, см	Форма захворювання	Тяжкість захворювання за Брінгемс (шкалою від 1 до 4)	Розміщення уражень (локалізація/генералізація)	Локалізація уражень (частини тіла)	Площа уражень, %	Ускладнення	Лікарські засоби та виробні медичного призначення	Кількість одиниць препарату на рік застосування	Включити в розрахунок 100% потреби
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Засіб для відкриття рин, стерильний Мерієв® 10x18 см, або еквівалент, 1 бинт.	1080	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	48	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	48	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Пов'язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент, 1 бинт.	24	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Серветки з нетканого матеріалу Mesofix, стерильні, 10x10см (2 шт), або еквівалент, 1 серветка.	7200	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	300	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	1800	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	1200	ТАК
10	ССО	22.11.2012	22	134	дистрофічна форма, множинні ерозії СОПР, депіляція язика, хейліт. Виснаження переторок носа. Полідефіцитна анемія легкого ступеня. Дефіцит вітаміну Д. Білково-енергетична недостатність I ступеня. Хронічні закривні	36	генералізована	/інше	/19,00	анемія, алоніхія, білково-енергетична недостатність, ерозії СОПР, остеоїт / остеоїдоз, хронічні закривні, інше	Бинт еластичний фіксуючий BASTIF® FIXA-CREP 12 см x 4 м, або еквівалент, 1 бинт.	600	ТАК

Валентина ГІНЗБУРГ

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Ірина ТИЩЕНКО

Ольга ЧУБАР

Директор Департаменту охорони здоров'я

Заступник директора - начальник управління лікувально-профілактичної допомоги

Начальник відділу спеціального фонду та цільових програм

Експерт Департаменту охорони здоров'я з дерматовенерології